



**Comuni del Piano di Monitoraggio
FLAVESCENZA DORATA**

**Progetto "AREA MOSCATO CUNEESE" VALLI BELBO, TINELLA, BORMIDA+ALBA
(COMUNICATO VALIDO PER I SEGUENTI COMUNI: Alba, Castiglione T. , Castino, Cossano
B. , Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta B., Santo Stefano B., Treiso, Trezzo Tinell
TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2023 contro *Scaphoideus titanus***

**Nei vigneti con presenza di catture di scafoideo o di elevata
incidenza di flavescenza dorata**

**Terzo trattamento insetticida per le aziende in viticoltura integrata
UTILIZZARE**

Deltametrina, Etofenprox, Lambda-Cialotrina, Tau-Fluvalinate

Oppure Acetamiprid o Flupyradifurone

**tenendo in considerazione le tempistiche di carenza e di vendemmia.
dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore)
estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere
la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).**

SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- **Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata da metcalfa nei mesi di luglio e agosto. Nel caso di presenza di melata, per evitare apicidi, è utile intervenire in precedenza con un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata.**
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- bagnare bene tutta la vegetazione da entrambi i lati del filare, tutti i filari, compresi polloni e ricacci lungo il fusto;
- **utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie;**
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Per i vigneti situati a distanze tra i 10 e i 30 metri (sotto i 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

SANZIONI

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO